



Information Verhalten nach Operation und/oder Nahtentfernung

DR. ANDERS
zahnarzt

Hinweise zum Verhalten nach einer Implantation oder Augmentation

- am Operationstag und zwei Tage danach nicht rauchen und keinen übermäßigen Alkoholgenuss
- Körperliche Anstrengungen vermeiden
- Essen und Trinken erst nach Abklingen der örtlichen Betäubung
- Flüssige und weiche Nahrung, auf Milch und Milchprodukte möglichst verzichten
- Implantatbereich weder mit den Fingern noch mit der Zunge berühren
- Nicht im Bereich des Implantates kauen
- Den Mund im Bereich der Wunde nur mit Chlorhexamed spülen. In der Zeit der Einheilung keine Munddusche oder elektrische Zahnbürste im Bereich der Wunde verwenden
- Durch gute Mundhygiene die übrigen Zähne und Kieferbereiche pflegen
- Bei eventuellen Nachblutungen möglichst lange auf ein sauberes Taschentuch oder eine Mullbinde beißen, ggf. wenden Sie sich bitte an das Praxisteam
- Schwellungen im Bereich des Operationsgebietes, der Wange und des Kinns sind normal und werden nach einigen Tagen abgeklungen sein. Eine Linderung erfolgt durch Kühlung von außen

Hinweise zum Verhalten nach der Nahtentfernung

- Den Wundbereich mit einer weichen Zahnbürste vorsichtig pflegen. Je besser die Wunde verheilt ist, desto stärker und intensiver kann die Massage durch die Zahnbürste im Bereich des Operationsgebietes sein
- Bei Schmerzen oder ungewöhnlichen Erscheinungen, wie Zahnfleischbluten, Reizungen oder Schwellungen, wenden Sie sich bitte an das Praxisteam
- Falls Sie nicht genau wissen, wie die Zahnpflege zu erfolgen hat, wenden Sie sich bitte an das Praxisteam
- Nach der Versorgung des Implantates mit Zahnersatz muss das Implantat peinlichst genau gepflegt werden
- Implantatnachkontrollen erfolgen im Rahmen der halbjährlichen zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen

Ihr Praxisteam Dr. Anders wünscht Ihnen gute Besserung!